

アクネトレント（イソトレチノイン）

服用に関する説明/同意書

イソトレチノインは、ビタミンA誘導体の「レチノイド」と呼ばれるグループに属する難治性のニキビ治療に使用される内服薬です。

皮脂の分泌を抑える作用、毛穴の角化異常を改善する作用、アクネ菌に対する抗菌作用、抗炎症作用があり、重症ニキビや酒さに有効な薬剤です。

海外ではニキビ治療で保険適用があるお薬ですが、日本では未承認のため、自費診療となります。

●治療期間

重大な副作用がなければ最低でも16週間の継続内服が必要です。

症状が消失してからも2か月程内服を継続することにより再発率を減らすことができます。

内服開始後、数週間は症状が悪化したと感じられることがあります。お薬による反応性の変化ですので、継続することで改善していきます。

●内服方法

1日1回 食後に服用

※体重や症状により2回服用の場合もあります。

●用法・容量について

1日20mg～40mg

※体重や症状により決定します。

●副作用について

妊娠又は妊娠している可能性がある場合、胎児に先天異常（奇形など）、流産、早産、死産を引き起こすおそれがあるため、妊娠している、妊娠する予定である又は妊娠する可能性がある場合は、決して服用してはいけません。

乾燥、かゆみ、皮膚炎（発疹、皮むけ）、関節痛、頭痛、吐き気、嘔吐、気分の落ち込み、頭髮の脱毛、視力障害

稀にアナフィラキシーショックなどの重篤な副作用が生じる場合があります。

いずれかの激しい症状が出た場合には直ちに服用を中止し、医師にご相談ください。

●アクネトレントを使用した治療ができない方

妊娠中、妊娠を希望している方

※服用期間中とその前後3ヶ月間は避妊してください。

授乳中の方

※服用期間中とその後3ヶ月間は授乳してはいけません。

服用中とその後3ヶ月間は献血してはいけません。

12歳未満の方や成長期で身長が伸びている方（骨の発達障害が起きる可能性があります）

ニキビ治療薬（ディフェリンゲル、ベピオゲルなど）の使用、併用中の方

（使用を中止してから2週間あけて内服可能となります）

トレチノイン製剤、ビタミンA製剤でアレルギーを起こしたことがある方

テトラサイクリン系の抗生剤（ミノマイシン ビブラマイシン）内服中の方

抗てんかん薬（フェニトイン）内服中の方

うつ病、その他の精神疾患で治療中もしくは過去に治療を受けたことがある方

肝機能障害のある方

高脂血症のある方

大豆アレルギーの方

その他医師がイソトレチノイン製剤を使用したニキビ治療に適さないと判断した方

●注意事項

レーザー、ピーリング、HF、脱毛などの施術は服用終了後6か月あけて行ってください。

内服中にレチノール、ピーリング作用を含む化粧品は使用しないでください。

副作用により服薬を中止せざるを得ない状況であったとしても、返金はいりません。

以上の説明をすべて読み理解しました。アクネトレント（イソトレチノイン）内服治療を希望します。

年 月 日

患者氏名： _____

保護者氏名： _____